

ESMAABIVÕTTED MÜRGISTUSTE KORRAL

Suukaudselt manustatud kemikaal

Suud loputada ja teralised ained pesta limaskestadelt, nahalt maha veega. Juua väikeste lonksudena vett, et allaneelatud kemikaali lahjendada: täiskasvanule maksimaalselt 240 ml; lapsele maksimaalselt 15 ml/kg. Täpsemate tegevusjuhiste saamiseks helista mürgistusfoliiniile 16662.

NB!

Kui on teada õnnetuse põhjustanud aine, kontrollige toote märgistust (kas ärritav või söövitav) võimalusel leidke toote pH. Ained pH-ga vahemikus 2 kuni 11,5 on ärritavad. pH <2 on söövitavad happed ja >11,5 söövitavad alused.

Mürgine aine nahal

Võta saastunud riided seljast vältides täiendavat kokkupuudet kemikaaliga. Loputa nahka jaheda jooksva veega vähemalt 15 minuti jooksul. Tugeva valu, põletushaavade või põletiku tekkimise korral tuleb pöörduda koheselt arsti poole. Täpsemate tegevusjuhiste saamiseks helista mürgistusfoliiniile 16662.

Mürgine aine silmas

Loputa silmi koheselt rohke veega vähemalt 15 minutit (söövitavate ainete korral 30 min).

Täpsemate tegevusjuhiste saamiseks helista mürgistusfoliiniile 16662.

Sissehingatud mürgine aine

Toimeta kannatanu värske õhu kätte. HOIDU ise mürgise aine sissehingamisest. Kui kannatanu kaebused ei möödu värskes õhus, tekkib tugev köha, õhupuudus või muud sümptomid - täpsemate tegevusjuhiste saamiseks helista mürgistusfoliiniile 16662 või 112.



AKTIIVSÖE MANUSTAMINE

Allaneelatud ainete mürgistusohu puhul on üldiseks kodus koheselt antavaks ravimiks aktiivsüsi, mis õigeaegselt antuna võib takistada suu kaudu võetud aine imendumist organismi, vähendades seeläbi mürgistusohu. Aktiivsütt tuleks manustada võimalikult kiiresti, soovitatavalt esimese 30 minuti jooksul mürgi manustamisest.

AKTIIVSÜTT EI TOHI ANDA ILMA ARSTI VÕI INFOLIINIGA 16662 KONSULTEERIMATA. AKTIIVSÜSI AI AITA ABSOLUUTSELT KÕIKIDE MÜRGISTUSTE KORRAL!

Aktiivsöe tablettide orienteeruvad kogused:

- Apteekides on müügil peamiselt 250 mg-sed aktiivsöe tabletid.
- Täiskasvanu annus on orienteeruvalt 50 g = 200 tabletti, 10-kilose lapse annus on 10 g = 40 tabletti
- Aktiivsöe pulbri Carbomix pudel on 50 g, mis on täiskasvanu annus, lapse annus on 3 spl / 10 kehakaalu kilogrammi kohta ehk siis nt 10 kg kaaluval lapsele 3 spl, 20 kg kaaluval lapsele 6 spl jne.

Soovitused aktiivsöe manustamiseks (eriti lastele):

- purusta tabletid väikeses koguses vees;
- sega kogu aktiivsöe annus mingi heamaitselise toidu sisse (jogurt, jäätis, piim, limonaad vms.);
- jälgi, et toidu kogus ei ületaks kogust, mida laps suudab tavaliselt ära süüa.

Aktiivsütt ei tohi manustada:

- teadvushäirega või teadvuseta patsiendile kodustes tingimustes, kuna patsient võib selle tagajärjel lämbuda;
- alkoholi, petrooleumitooteid või söövitavaid aluseid ja happeid joonud patsientidele, ka fluori; tsüaniidi; metallide (nt raud ja liitium) mürgistuse korral, kuna aktiivsüsi neid aineid ei seo ning võib mürgistuse kulgu raskendada. Soovituste aluseks on RV ravijuhised:

<https://www.16662.ee> -> Tervishoiutöötajale ->

-> Rahvusvahelised ravijuhised



Mürgistusinfo

16662

Aga mina
www.agamina.ee